

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

สนองพระราชดำริ

โดย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ความหลากหลายทางชีวภาพของ เห็ดและไลเคน

ในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์



ชื่อหนังสือ	ความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดรา ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์
ผู้เรียบเรียง	วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ อาทิตยา ชายศิริ พิจิตรา เพ็งหมื่นราช และศิริลักษณ์ พิมพ์ศร
ภาพประกอบ	อาทิตยา ชายศิริ วิไลลักษณ์ โคมพันธุ์ พนิดา ผันแปล และจันทิมา อบรมทรัพย์
ออกแบบรูปเล่ม	สรารุช สิ้นชัย
จัดพิมพ์โดย	สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ 398 หมู่ที่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

คำนำ

หนังสือเรื่องความหลากหลายทางชีวภาพของเห็ดและไลเคนในมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรียบเรียงขึ้นเพื่อรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับเห็ดและไลเคนในพื้นที่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ซึ่งแบ่งพื้นที่ในการสำรวจข้อมูลออกเป็น 2 พื้นที่ คือ สวนพฤกษศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ ย่านมัทรี และพื้นที่ป่าบริเวณองค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ โดยข้อมูลจากการสำรวจถูกเก็บรวบรวม และเผยแพร่ในรูปแบบของการจัดพิมพ์เป็นหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ซึ่งมีรายละเอียดของเนื้อหาประกอบด้วย ชื่อวิทยาศาสตร์ ชื่ออันดับ ชื่อวงศ์ และลักษณะทางสัณฐานวิทยาของเห็ดและไลเคน

หนังสือนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ได้ร่วมสนองพระราชดำริ และสนับสนุนงบประมาณในการจัดทำหนังสือ และหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-book) ครั้งนี้ คณะผู้เรียบเรียงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าหนังสือเล่มนี้จะมีประโยชน์ไม่มากนักน้อยสำหรับที่ผู้สนใจ และอาจจะช่วยสร้างแรงจูงใจให้มีการศึกษาค้นคว้า ตลอดจนเกิดจิตสำนึกและตระหนักในคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติ ที่จะนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ต่อไป

วิไลลักษณ์ โคมพันธ์ และคณะ
ผู้เรียบเรียง





สารบัญ

	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
Order Agricales	6
Order Russulales	18
Order Xylariales	20
Order Polyporales	24
Order Trichiales	36
Order Stereales	38
Order Dacrymycetaceae	40
Order Auriculariales	42
Order Cantharellales	44
Order Cantharellales	48
Order Boletales	56
กลุ่ม โฟลิโอส (Foliose Lichen)	60
กลุ่ม ครัสโตส (Crustose Lichen)	64





ORDER
AGRICALES

เห็ด *Marasmius* sp. No.1



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Marasmius* sp. No.1

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Marasmiaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกมีรูปทรงระฆังคว่ำ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ตรงกลางมีตุ่ม
นูนเล็ก สีน้ำตาลปนแดง ก้านทรงกระบอก เรียบ ผิวหมวกมีร่องตื้นตาม
แนวรัศมีบดค่อนข้างถี่ ขอบครึ่งสีน้ำตาลอมชมพูเนื้อครึ่งสีครีมเทา

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง ประเมศ รักชาวรงค์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ :
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนา
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.



เห็ด *Marasmius* sp. No.2



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Marasmius* sp. No.2

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Marasmiaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกมีรูปทรงระฆังคว่ำ สีน้ำตาลปนครีม ตรงกลางมีตุ่มนูนเล็ก สีน้ำตาล รอบๆ ปลายยอด ยุกตัวลงเล็กน้อย ผิวเรียบ มีลักษณะเป็นลอนคลื่น ริมขอบเป็นร่องละเอียด ก้านทรงกระบอก ผิวก้านเรียบ

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง พรเมศ รักขางษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

เห็ด *Crinipellis* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Crinipellis* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Marasmiaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกมีลักษณะคล้ายหมวกทรงสูง แต่ปลายบนเรียบแบน ผิวด้านบนมีขนสีน้ำตาลขนาดเล็กปกคลุมเป็นวงแหวน ขอบหมวกเรียบ

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง ปรเมศ รักชาวพงษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.



เห็ดเฟืองล่อสีม่วง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Marasmius purpleostriatus* Hongo.

ชื่อสามัญ เห็ดเฟืองล่อ

ชื่อวงศ์ Marasmiaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกรูปประฆังไปจนถึงนูน เป็นแฉ่งกลางหมวก มีร่องลึกกว้าง ม่วงเข้ม มีริ้วเป็นรัศมีกว้าง ยาวเกือบถึงกลางหมวก สีม่วงอมน้ำตาล ครีบ ติดก้าน กว้าง เรียงห่าง สีขาว ก้าน ทรงกระบอก เรียบ สีน้ำตาลอมม่วง

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดกระดุมทองเหลือง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Agaricus trisulphuratus* Berk.

ชื่อสามัญ เห็ดกระดุมทองเหลือง

ชื่อวงศ์ Agaricaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกเห็ดรูปร่ม สีส้มอมเหลือง ปกคลุมด้วยเกล็ดฟูสีส้ม ซึ่งหลุดเมื่อดอกแก่ครีบไม่ติดก้าน เรียงถี่ ขอบหยาบคล้ายซี่ฟัน ขาวแล้วเปลี่ยนเป็นชมพูถึงน้ำตาลดำ ก้านทรงกระบอก กลวงเล็กน้อย ส้มอมเหลือง ปกคลุมด้วยเกล็ดฟูสีส้ม วงแหวนบอบบาง มักจะหลุดหายไปเมื่อดอกแก่

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทรศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.





เห็ด *Agaricus* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Agaricus* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Agaricaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกเห็ดรูปคล้ายระฆังคว่ำ เมื่อบานขอบกลางออกเกือบแบนราบ เหลือส่วนกลางหมวกนูนเล็กน้อย หมวกเห็ดสีขาวนวล ผิวเรียบ และมีลายนูนเป็นรัศมีสั้น ๆ กระจายออกไปจากกลางหมวก ขอบบางทำให้บางส่วนม้วนงอ

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดร่มเหลืองก้านดำ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Marasmius conicopapillatus* Henn.

ชื่อสามัญ เห็ดร่มเหลืองก้านลวดดำ

ชื่อวงศ์ Tricholomataceae

ลักษณะทั่วไป หมวกมีรูปทรงระฆังคว่ำ สีสนิม น้ำตาลอมส้มถึงส้มอมแดง กลางหมวกสีส้มเข้ม ด้านบนยวบตัวลงเป็นทรงกลม ตรงกลางมีตุ่มนูนเล็ก ครีบติดก้าน มีสีขาวนวล มีเนื้อเยื่อที่มีลักษณะเป็นวงแหวน ก้านยาว ทรงกระบอกสีดำ ผิวเรียบมันวาว

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง ปรเมศ รักษาพงษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.





เห็ด *Claudopus repens* Petch.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Claudopus repens* Petch.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Entolomataceae

ลักษณะทั่วไป หมวกมีรูปทรงกลม ขนาด 4-6 มล. สีขาวนวล ผิวมีขนละเอียดคล้ายผ้าฝ้าย ขอบเรียบสีขาว ดอกเห็ดเกาะติดไม้ด้านข้าง ไม่มีก้าน โคนมีเส้นใยขึ้นรอบ ครีบสีขาว เรียงตัวตามแนวรัศมีจากด้านข้างดอก

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง ประเมศ รักชวานงษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.



เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Schizophyllum commune* Fr.

ชื่อสามัญ เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก

ชื่อวงศ์ Schizophyllaceae

ลักษณะทั่วไป ดอกรูปพัดจนถึงเปลือกหอย แห้ง ขอบงอกลง เป็นลอนและมักฉีกแยก มีขนสีขาหรือขาวปนเทาปกคลุมหนาแน่น ขาวหรือขาวปนเทา ครีบเรียงเป็นรัศมีออกไปจากฐานดอกและแยกเป็นแฉกตามยาวและม้วนงอลง น้ำตาลอมชมพูหรือน้ำตาลอมเทา ก้าน ออกข้าง เกือบไม่มีก้าน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดดาวกระจาย



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Leucocoprinus fragilissimus* (Rav.) Pat.

ชื่อสามัญ เห็ดดาวกระจาย

Family Agaricaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปไข่แล้วแบน บาง โปร่งใส สีเทา มีร่องจากขอบไปกลางหมวก ขอบงอขึ้นเมื่อดอกแก่ กลางหมวกสีน้ำตาลอ่อน ครีบติดก้าน แคบเรียงห่างเล็กน้อย สีขาว ก้าน ทรงกระบอก

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดรังนก



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Cyathus striatus* (Huds.) Willd. & Pers.

ชื่อสามัญ เห็ดรังนก

ชื่อวงศ์ Nidulariaceae

ลักษณะทั่วไป ดอก กว้างและสูง 1-1.5 ซม. รูปถ้วย ปกคลุมด้วยเยื่อบางขาว ซึ่งปริแตกเมื่อแก่ ผิวด้านนอกมีขนหยาบ น้ำตาลแดง ด้านในมีร่องในแนวตั้ง เป็นมันเงาเรียบ เทาหรือน้ำตาลอมเทา ไข่กว้าง 1-2 มม. รูปเลนส์ เทาอ่อน ยึดติดกับถ้วยด้วยเส้นด้ายเล็ก ๆ

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ORDER
RUSSULALES

เห็ด *Russula violeipes* Quel.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Russula violeipes* Quel.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Russulaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก 2-8 ซม. นูนแล้วแบน เป็นแอ่งกลางหมวก เหง้า เรียบ
แดงอมม่วงบางส่วนสีจางเป็นเหลือง ครีบ ติดก้าน แฉก ยาวเท่ากัน มัก
เป็นรูปสี่เหลี่ยมใกล้ก้าน สีครีม ก้าน เรียวลงไป ตอนบนขาวอมชมพู แดงอม
ม่วงลงไปข้างล่าง

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ORDER
XYLARIALES

เห็ด *Xylaria hypoxylon* (L. ex Hook.) Grev.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Xylaria hypoxylon* (L. ex Hook.) Grev.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Xylariaceae

ลักษณะทั่วไป สโตรมา สูง 4-6 ซม. ทรงกระบอกเรียวยาวเล็ก มียอดแหลม มักแตกเป็นรูปส้อม และแตกแขนง ส่วนบนปกคลุมด้วยผงสีขาวก่อน และมักจะมีผงสปอร์สีขาวปกคลุมบริเวณพื้นผิวโดยรอบส่วนปลาย

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Xylaria* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Xylaria* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Xylariaceae

ลักษณะทั่วไป สโตรมา มีลักษณะเป็นแท่ง ผิวด้านนอกมีสีน้ำตาลถึงสีดำ มีชั้นที่ลอกได้ สีเทา ชั้นในสีขาวหม่นปนเทา รูปทรงกระบอกถึงกรวยปลายมน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง ปรมศ รักชาวงษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.

เห็ด *Daldinia* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Daldinia* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Xylariaceae

ลักษณะทั่วไป ดอกเห็ดรูปค่อนข้างกลม สีน้ำตาลอมม่วง ผิวเรียบ เป็นมัน ใต้ผิวมีโพรง รูปขวดก้นกลมเล็ก ๆ เรียงแถวเดี่ยวฝังอยู่ในเนื้อ

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง ประเมศ รักชวาณิช. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.





ORDER
POLYPORALES

เห็ดกรวยทองตะกู่



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Microporus xanthopus* (Fr.) Ktz.

ชื่อสามัญ เห็ดกรวยทองตะกู่

ชื่อวงศ์ *Polyporaceae*

ลักษณะทั่วไป ดอกรูปกรวยปากกว้าง มีริ้วเรียงเป็นรัศมี ย่นเล็กน้อย เป็นมันวาว เป็นแถบวงกลมของสีน้ำตาลอมเหลือง น้ำตาลแดงไปถึงน้ำตาลเข้ม ด้านล่างเต็มไปด้วยรูกลมเล็ก ๆ สีขาวหม่นไปจนถึงน้ำตาลอ่อน ก้านอยู่กึ่งกลางหรือไม่อยู่กึ่งกลาง ทรงกระบอก แข็ง เรียบ ตอนบนใหญ่ สีน้ำตาล โคนแผ่เป็นแป้นวงกลมเล็ก ๆ

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.





เห็ดกระต้างขาว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lenzites vespacea* (Pers.) Ryv.

ชื่อสามัญ เห็ดกระต้างขาว

ชื่อวงศ์ Polyporaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก กว้าง 6-10 ซม. โคนหนา 1-2 ซม. รูปครึ่งวงกลมถึงรูปพัด มีขนละเอียดเรียบเมื่อแก่ แท่งคล้ายไม้ก๊อก ขาวถึงสีฟางข้าว มักมีแถบวงกลมเป็นร่องและมีริ้วบาง ๆ รู คดเคี้ยว บางที่คล้ายแผ่นครีบลีซาว ก้าน ไม่มี

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดร่มพม่า



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Lentinus arcularius* (Batsch) Zmitr.

ชื่อสามัญ เห็ดร่มพม่า

ชื่อวงศ์ Polyporaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก ชูนแล้วแบน กลางหมวกเว้าเล็กน้อย มีเกล็ดและขนบางๆที่ขอบ หมวกมีสีน้ำตาลอมเหลืองถึงสีน้ำตาลอ่อน รู มีสีขาวถึงเหลืองอ่อน ก้าน ทรงกระบอก อยู่กึ่งกลางดอก มีเกล็ดเล็กน้อย สีน้ำตาลอ่อนถึงน้ำตาลแก่

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง ประเมศ รักชาวรงค์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.



Favolus brasilensis (Fr.) Fr



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Favolus brasilensis* (Fr.) Fr

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Polyporaceae

ลักษณะทั่วไป ดอกรูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด ผิวด้านบนมีสีขาวนวลอมน้ำตาลอ่อน มีรอยคลื่นเนื่องจากรอยของเส้นรูด้านล่าง ใต้ดอกเป็นรูขนาดใหญ่ รูลักษณะเหลี่ยมคล้ายรังผึ้ง ก้านเกิดด้านข้างของดอก

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดรังแตน



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Hexagonia tenuis* (Cke.) Fr

ชื่อสามัญ เห็ดรังแตน

ชื่อวงศ์ Polyporaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปครึ่งวงกลม รูปไตหรือรูปพัด เรียบ มีรอยย่นเรียงเป็นรัศมี ขอบบางและคม เป็นคลื่น มีแถบวงกลมของสีน้ำตาลเทา น้ำตาลอ่อน น้ำตาลอมเหลือง และน้ำตาลหม่นปนดำ รู สีน้ำตาลอมเทา ปากรูรูปเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม สีน้ำตาลอมเทา ก้าน ไม่มี

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทรศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Pycnopus* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pycnopus* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Polyporaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปครึ่งวงกลมถึงรูปไต มีขนอ่อนแล้วเรียบ หยาบ ย่นขรุขระ สีเหลืองอมน้ำตาลจนถึงสีน้ำตาลอ่อน รู สีนํ้าตาลอ่อน ปากรู เหลี่ยมหรือบิดเบี้ยวสีเดียวกับสีหมวก

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดหลินจือ



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ganoderma lucidum* (Ley.ex Fr.) Kar.

ชื่อสามัญ เห็ดหลินจือ

ชื่อวงศ์ Ganodermataceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปครึ่งวงกลมไปจนถึงรูปไต เรียบ เป็นมัน เหมือนเคลือบด้วยน้ำมันชักเงา เป็นแถบวง สีน้ำตาลแดง รู สีน้ำตาล ปากรู กลมถึงเหลี่ยม สีขาวถึงเหลืองอมเขียว ก้าน ติดด้านข้างของขอบหมวก เป็นมันเหมือนเคลือบด้วยน้ำมันชักเงา สีน้ำตาล

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Ganoderma* sp. No.1



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ganoderma* sp. No.1

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Ganodermataceae

ลักษณะทั่วไป หมวก เป็นแผ่นรูปครึ่งวงกลมหรือรูปกบี่มีสีเหลืองปนน้ำตาลหรือสีน้ำตาลอมส้ม ผิวขรุขระ ย่น ด้านล่างเป็นรูกลมเล็ก ๆ เชื่อมติดกัน รูสีเหลืองอมน้ำตาล ปากรู สีขาวนวล ไม่มีก้าน

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Ganoderma* sp. No.2



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ganoderma* sp. No.2

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Ganodermataceae

ลักษณะทั่วไป หมวก มีรูปร่างคล้ายไต สีน้ำตาลปนขาว ผิวด้านบนมีลักษณะขรุขระ ไม่มีครีบด้านล่างมีรูกลมเล็ก ๆ มีสีขาว ก้าน อยู่ทางด้านข้างของดอกเห็ด

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Irpex* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Irpex* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Irpicaceae

ลักษณะทั่วไป เห็ดชนิดนี้มักเคลื่อนไปตามผิวไม้ ที่ริมขอบมีเนื้อเยื่อยื่นออกมาเล็กน้อย
ตัวดอกเห็ดแผ่ออกเป็นรูปวงกลม ผิวปกคลุมด้วยขนคล้ายกำมะหยี่
มีแนวสันเป็นคลื่น สีเหลืองสด

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Trametes cingulata* Berk.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trametes cingulata* Berk.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Polyporaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปครึ่งวงกลมหรือรูปพัด เรียบ สีขาวนวล มีแถบวงกลมและร่องหยักขอบเป็นริ้วสั้น ๆ รูมีสีน้ำตาลอ่อนปนเหลือง ปากรูมีลักษณะกลม

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ORDER
TRICHIALES

เห็ดแปรงปัดฝุ่นจิ๋ว



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Arcyria incarnate* (Pers ex J.F. Gmd) Pers.

ชื่อสามัญ เห็ดแปรงปัดฝุ่นจิ๋ว

ชื่อวงศ์ Arcyriaceae

ลักษณะทั่วไป ดอกด้านบนมีลักษณะคล้ายรูปส้น เมื่อแก่จะแตกออกทำให้ฟูคล้ายแปรงปัดฝุ่น มีสีชมพูอมน้ำตาล เมื่อแก่จะมีสีเข้มขึ้น มีก้าน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



ORDER
STEREALES

เห็ด *Podoscypha nitidula* (Berk.) Pat



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Podoscypha nitidula* (Berk.) Pat.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Podoscyphaceae

ลักษณะทั่วไป เห็ดชนิดนี้มีรูปร่างคล้ายพัดจีบ หรือรูปทรงกรวย หมวกเห็ดบาง สีขาวนวล ด้านบนมีขนละเอียด สีน้ำตาลแดงและมีแนวร่องเรียงตัวเป็นแนววงกลม ริมขอบมีลักษณะคล้ายฟัน สีขาวนวล ผิวด้านล่างเรียบ

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



**ORDER
DACRYMYCETACEAE**

เห็ดพวยทอง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dacryopinax spathularia* (Schw.) Martin.

ชื่อสามัญ เห็ดพวยทอง

Family Dacrymycetaceae

ลักษณะทั่วไป ดอก มีรูปกระบองหรือรูปร่างคล้ายช้อน ก้านรูปทรงกระบอก ขอบเป็นลอน ปลายด้านบนแผ่แบน เนื้อนุ่มและเหนียวคล้ายวุ้น สีเหลืองถึงส้ม

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



**ORDER
AURICULARIALES**

เห็ดหูหนู



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Auricularia delicata* (Fr.) Henn.

ชื่อสามัญ เห็ดหูหนู

ชื่อวงศ์ Auriculariaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก เกือบกลมหรือรูปพัด สีน้ำตาลอ่อนหรือสีน้ำตาล ขอบงอลงเล็กน้อย เนื้อบาง นิ่ม ยืดหยุ่น ผิวด้านบนเรียบหรือย่นเล็กน้อย ผิวด้านล่างมีสีขาวนวล มีขนละเอียด และมีรอยจีบย่นหยักเป็นตาข่าย

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



**ORDER
CANTHARELLALES**

เห็ด *Craterellus cornucopioides* (L. ex Fr.) Pers



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Craterellus cornucopioides* (L. ex Fr.) Pers.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Cantharellaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปทรงกรวย ผิวบนเรียบ มีขนยาวปกคลุมเล็กน้อย สีดำคล้าย สีเขม่า ริมขอบมีลักษณะบิดพลิ้วเป็นลอนคลื่น ด้านใต้มีผิวเรียบหรือ รุขขระ เป็นริ้วร่อง แต่ร่องจะเชื่อมประสานกัน สีเทาอ่อน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง ปรมศ รักชาวงษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.



เห็ด *Pterula* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Pterula* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Pterulaceae

ลักษณะทั่วไป เห็ดปะการังชนิดนี้มีลักษณะแผ่แบนหรือเป็นพุ่ม มีกิ่งก้านที่แตกแขนง ปลายกิ่งก้านเรียวแหลม สีเหลืองอมน้ำตาล ลำต้นสีน้ำตาลอ่อน ผิวขรุขระเล็กน้อย โคนมีเส้นใยแผ่ออกคล้ายราก

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง พรเมศ รักขางษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.







**ORDER
AGRICALES**

เห็ด *Agaricus* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Agaricus* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Agaricaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกเห็ดแบนราบ สีน้ำตาลอมม่วง กลางหมวกสีน้ำตาลเข้ม ด้านบนหมวกมีเกล็ดสีน้ำตาลหม่นปนเทากระจายอยู่ ครีบไม่ติดก้าน กว้าง เรียงถี่ สีน้ำตาลอมม่วง ก้านดอก รูปทรงกระบอกสีน้ำตาลอ่อน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทรศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Amanita vaginata* var. *vaginata* (Bull. ex Fr.) Vitt



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Amanita vaginata* var. *vaginata* (Bull. ex Fr.) Vitt.

ชื่อสามัญ -

Family Pluteaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปไข่ นูนแล้วแบน ผิวเป็นมันเงา สีเทาปนน้ำตาล กลางหมวก มีสีเข้มกว่า ขอบมีริ้ว ครีบ ไม่ติดก้าน กว้าง เรียงห่างกันเล็กน้อย สีขาว ก้าน รูปทรงกระบอก เกือบเรียบ ภายในสีขาว กลวง

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Ramaria* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Ramaria* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Clavariaceae

ลักษณะทั่วไป ดอกเห็ดรูปปะการัง แตกแขนงเป็นพุ่ม สีเหลืองอมน้ำตาล ปลายแขนงมีสีม่วงอ่อน ก้านอ้วน เรียวลงไปที่โคน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ดปะการังยอดเขากวาง



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Scytinopogon angulisporus* (Pat.) Cor.

ชื่อสามัญ เห็ดปะการังยอดเขากวาง

ชื่อวงศ์ Clavariaceae

ลักษณะทั่วไป ดอก รูปคล้ายปะการัง มีแขนงแบนและแตกแขนงไปทางเดียวกัน ก้านเรียวยาว แขนงหลักแบน แตกแขนงคล้ายเขากวาง สีขาวนวลหรือสีเทา

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.

เห็ด *Inocybe* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Inocybe* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Cortinariaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก รูปทรงระฆังคว่ำ มีปมที่ยอด ชู่นแล้วแบน สีน้ำตาลไหม้ กลางหมวกแตกออกเป็นเกล็ดเล็ก ๆ ขอบแยกเป็นทางรัศมีหรือปริแยก ครีบ ติดก้าน แฉบ เรียงถี่ สีน้ำตาลปนเทา ก้าน ทรงกระบอก กลวง สีดำ

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.



เห็ด *Marasmius* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Marasmius* sp.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Marasmiaceae

ลักษณะทั่วไป หมวกมีรูปทรงระฆังคว่ำ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 1-2 ซม. ตรงกลางมีตุ่ม
นูนเล็กสีส้มปนน้ำตาล ก้านทรงกระบอก เรียบ ผิวหมวกมีร่องตื้นตาม
แนวรัศมี ครีบค่อนข้างถี่ ขอบครีบสีน้ำตาลอมชมพูเนื้อครีบสีครีมอมเทา

ข้อมูลการรับประทาน ไม่มีข้อมูลการรับประทาน

อ้างอิง อนงค์ จันทร์ศรีกุล. (2551). ความหลากหลายของเห็ดและราขนาดใหญ่
ในประเทศไทย. กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์.





**ORDER
BOLETALES**

เห็ด *Scleroderma citrinum* Pers



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Scleroderma citrinum* Pers.

ชื่อสามัญ -

ชื่อวงศ์ Sclerodermataceae

ลักษณะทั่วไป ดอก ทรงเกือบกลม สีน้ำตาลเหลือง เตี้ยลงเมื่อแก่ ปกคลุมด้วยปุ่มนูนเหนียว ตรงกลางมีสีน้ำตาลเข้มกว่า เปลือกหนา สีขาว ปรแตกเป็นพู่เมื่อแก่

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานไม่ได้

อ้างอิง ประเมศ รักชาวรงค์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.



เห็ด *Tylopilus* sp.



ชื่อวิทยาศาสตร์ *Tylopilus* sp.
ชื่อสามัญ -
ชื่อวงศ์ Strobilomycetaceae

ลักษณะทั่วไป หมวก มีรูปทรงโค้งคล้ายกระจกนูน สีชมพูอมส้ม ผิวเรียบหรือมีขนละเอียดคล้ายกำมะหยี่ขึ้นปกคลุม สีน้ำตาลอ่อน ก้านทรงกระบอกเรียบ สีเหลืองอมส้ม ถึงสีน้ำตาลอ่อน รูติดก้าน เรียวลงไปติดก้านเล็กน้อย ปากรูเหลี่ยม สีเหลืองอ่อน

ข้อมูลการรับประทาน รับประทานได้

อ้างอิง ปรเมศ รักษาพงษ์. (2544). *เห็ดและราในประเทศไทย*. กรุงเทพฯ : ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ.







กลุ่ม โฟลีโอส
(FOLIOSE LICHEN)

Parmotrema sp.



อันดับ Lecanorales
วงศ์ Parmeliaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Parmotrema* sp.
ชื่อสามัญ -

ลักษณะทั่วไป แทลัสส์ แบบโพลีโอสที่มีลักษณะเป็นแผ่นใบกว้างเจริญเป็นแนวรัศมี สีเขียวอมเทาถึงสีน้ำตาลอ่อนอมเทา ผิวเรียบ เป็นเงามัน โลบขนาดใหญ่ กลมมน ขอบยกขึ้น และหยักเป็นรอยฟันเรื่อๆ พบบนเปลือกไม้

อ้างอิง <http://www.lichen.ru.ac.th/index.php/lichen/thai-lichen>



Dirinaria sp.



อันดับ Lecanorales

วงศ์ Physciaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Dirinaria* sp.

ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบโฟลิโอส สีเทาถึงเทาอมเขียว โลบเจริญชิดกันเป็นลอน ยึดแน่นติดกับที่เกาะอาศัย แตกหน่อเป็นกระจุกผงแบ่งกลมๆ คล้ายขนนก ถ้วยฟูหรือดอกกะหล่ำ เรียกว่า ซอริเดีย พบบนเปลือกไม้

อ้างอิง <http://www.lichen.ru.ac.th/index.php/lichen/thai-lichen>





กลุ่ม ครัสโตส
(CRUSTOSE LICHEN)

Graphis sp.



อันดับ Ostropales

วงศ์ Graphidaceae

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Graphis* sp.

ลักษณะทั่วไป แทลลัสเป็นกลุ่มฝุ่นผง (ครัสโตส) สีขาวอมเทา ผิวเรียบ ไม่เงามัน มีแอโพทีเซียแบบเส้นคู่ เส้นแตกแขนง พบบนเปลือกไม้



Trypethelium sp.



อันดับ Pyrenulales
วงศ์ Physciaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Trypethelium* sp.

ลักษณะทั่วไป แทลลัส เป็นแบบครัสโตส สีเขียวซีม้มาถึงสีดำ ส่วนใหญ่ผิวเรียบ
แอสโคมาตาแบบเพอริทีเซีย ทรงครึ่งวงกลม สีดำ ยกตัวเหนือผิวแทลลัส
เจริญตัวแบบเดี่ยวหรือแบบกลุ่ม กระจายทั่วแทลลัส พบบนเปลือกไม้



Anthracothecium sp.



อันดับ Pyrenulales
วงศ์ Pyrenulaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Anthracothecium* sp.

ลักษณะทั่วไป แทลลัส เป็นแบบครัสโตส สีเขียวอมเทา ผิวเรียบ แอสโคมาตา แบบเพอริทีเซียทรงกลม สีดำ แผ่กระจายและยกตัวเหนือผิวแทลลัส ชัดเจน ส่วนใหญ่เจริญแบบเดี่ยว พบบนเปลือกไม้

อ้างอิง <http://www.lichen.ru.ac.th/index.php/lichen/thai-lichen>



Chrysothrix sp.



อันดับ Arthoniales
วงศ์ Chrysothricaceae
ชื่อวิทยาศาสตร์ *Chrysothrix* sp.

ลักษณะทั่วไป แทลลัส แบบครัสโตส สีเขียวอมเหลืองถึงสีเขียวอ่อน เป็นฝุ่นผง
ไม่มีขอบเขตแทลลัสชัดเจน พบซอริเดียสีเหลืองกระจายทั่วแทลลัส
ไม่มีการแบ่งชั้นต่างๆ พบบนเปลือกไม้

อ้างอิง <http://www.lichen.ru.ac.th/index.php/lichen/thai-lichen>







ดัชนี

ห	เห็ด <i>Marasmius</i> sp. 54
เห็ดกระด้างขาว 26	เห็ด <i>Marasmius</i> sp. No.1 7
เห็ดกระดุมทองเหลือง 11	เห็ด <i>Marasmius</i> sp. No.2 8
เห็ดกรวยทองตะกั่ว 25	เห็ด <i>Podoscypha nitidula</i> (Berk.) Pat 39
เห็ดแครง หรือเห็ดตีนตุ๊กแก 15	เห็ด <i>Pterula</i> sp. 46
เห็ดดาวกระจาย 16	เห็ด <i>Pycnoporus</i> sp. 30
เห็ดปะการังยอดเขากวาง 52	เห็ด <i>Ramaria</i> sp. 51
เห็ดแปรงปัดฝุ่นจิ๋ว 37	เห็ด <i>Russula violeipes</i> Quel 19
เห็ดพายทอง 41	เห็ด <i>Scleroderma citrinum</i> Pers 57
เห็ดเพ็ชร์สีม่วง 10	เห็ด <i>Trametes cingulata</i> Berk 35
เห็ดรังแตน 29	เห็ด <i>Tytopilus</i> sp. 58
เห็ดรังนก 17	เห็ด <i>Xylaria hypoxylon</i> (L. ex Hook.) Grev 21
เห็ดร่มหมา 27	เห็ด <i>Xylaria</i> sp. 22
เห็ดร่มเหลืองก้านดำ 13	A
เห็ดหูหนู 43	<i>Anthracotheceum</i> sp. 67
เห็ดหลินจือ 31	C
เห็ด <i>Agaricus</i> sp. 12	<i>Chysothrix</i> sp. 68
เห็ด <i>Agaricus</i> sp. 49	D
เห็ด <i>Amanita vaginata</i> var. <i>vaginata</i> (Bull. ex Fr.) Vitt 50	<i>Dirinaria</i> sp. 62
เห็ด <i>Claudopus repens</i> Petch 14	F
เห็ด <i>Craterellus cornucopioides</i> (L. ex Fr.) Pers 45	<i>Favulus brasiliensis</i> (Fr.) Fr 28
เห็ด <i>Crinipellis</i> sp. 9	G
เห็ด <i>Daldinia</i> sp. 23	<i>Graphis</i> sp. 65
เห็ด <i>Ganoderma</i> sp. No.1 32	P
เห็ด <i>Ganoderma</i> sp. No.2 33	<i>Parmotrema</i> sp. 61
เห็ด <i>Inocybe</i> sp. 53	T
เห็ด <i>Irpex</i> sp. 34	<i>Trypethelium</i> sp. 66





สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์

398 หมู่ที่ 4 ถนนสวรรคคีรี ตำบลนครสวรรค์ตก อำเภอเมืองนครสวรรค์ นครสวรรค์ 60000

โทร. 056-219100 ต่อ 1152,1139

